

Dispositif de Rémunération sur objectifs de santé publique		Lot-et-Garonne					France	
		Objectif cible	Résultats au 31/12/2011	Résultats au 31/12/2012	Résultats au 30/06/2013	Progression du 31/12/2011 au 30/06/2013	Ecart à l'objectif au 30/06/2013 (en points)	Résultats au 30/06/2013
Prévention	Part des patients 65 ans et plus vaccinés contre la grippe saisonnière	>=75%	55.0%	52.8%				
	Part des patients de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne et vaccinés contre la grippe saisonnière	>=75%	33.1%	33.9%				
	Part des patientes âgées de 50 à 74 ans ayant bénéficié d'une mammographie au cours des 2 dernières années	>=80%	69.5%	69.0%	68.2%	↓	11.80	63.9%
	Part des patientes âgées de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années	>=80%	57.1%	56.4%	57.2%	↔	22.79	57.6%
	Part des patients âgés de plus de 65 ans traités par vasodilatateurs*	<=5%	10.3%	6.8%	1.5%	↑	OBJECTIF ATTEINT	1.4%
	Part des patients âgés de plus de 65 ans traités par benzodiazépines à demi-vie longue*	<=5%	14.3%	13.1%	12.5%	↑	-7.45	11.6%
	Part des patients ayant débuté un traitement par BZD et dont la durée est supérieure à 12 semaines*	<=12%	17.4%	18.2%	17.7%	↔	-5.73	15.7%
Nombre de prescriptions d'antibiotiques pour les patients de 16 à 65 ans sans ALD dans l'année (pour 100 patients)*	<37	50.8	50.1	51.9	↓	-14.92	44.84	
Diabète	Part des patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 dosages d'HbA1c dans l'année	>=65%	43.5%	48.7%	52.5%	↑	12.55	50.0%
	Part des patients diabétiques ayant eu une consultation d'ophtalmologie ou un examen du fond d'œil au cours des 2 dernières années	>=80%	60.7%	60.8%	61.1%	↔	18.87	61.0%
	Part des patients diabétiques (hommes âgés de plus de 50 ans et femmes âgées de plus de 60 ans) traités par anti-hypertenseurs qui ont bénéficié d'un traitement par statine	>=75%	52.8%	55.2%	55.4%	↑	19.60	60.3%
	Part des patients diabétiques (hommes âgés de plus de 50 ans et femmes âgées de plus de 60 ans) traités par anti-hypertenseurs et statines qui ont bénéficié d'un traitement par aspirine faible dosage ou anticoagulant	>=65%	50.1%	51.8%	53.2%	↑	11.79	54.8%
Efficience de la prescription médicamenteuse	Part des prescriptions d'antibiotiques dans le répertoire des génériques (en nb de boîtes)	>=90%	79.3%	81.9%	82.3%	↑	7.71	81.5%
	Part des prescriptions d'IPP dans le répertoire des génériques (en nb de boîtes)	>=85%	65.5%	75.8%	86.6%	↑	OBJECTIF ATTEINT	90.6%
	Part des prescriptions de statines dans le répertoire des génériques (en nb de boîtes)	>=70%	36.7%	51.3%	62.2%	↑	7.78	65.4%
	Part des prescriptions d'antihypertenseurs dans le répertoire des génériques (en nb de boîtes)	>=65%	62.9%	70.5%	74.7%	↑	OBJECTIF ATTEINT	77.6%
	Part des prescriptions d'antidépresseurs dans le répertoire des génériques (en nb de boîtes)	>=80%	59.9%	60.8%	62.3%	↑	17.73	67.5%
	Part des IEC sur l'ensemble des IEC/Sartans (en nb de boîtes)	>=65%	41.2%	41.4%	41.4%	↔	23.62	39.9%
	Part des patients traités par aspirine faible dosage parmi les patients sous AAP	>=85%	83.8%	85.0%	85.8%	↑	OBJECTIF ATTEINT	83.9%