

Dispositif de Rémunération sur objectifs de santé publique		Objectif cible	Objectif intermédiaire	Résultats AGEN au 31/12/2011	Rappel de l'objectif cible	Rappel de l'objectif intermédiaire	Résultats AGEN au 30/06/2015	FRANCE	REGION	Situation	Ecart à l'objectif au 30/06/2015 (en points)
Prévention	Part des patients 65 ans et plus vaccinés contre la grippe saisonnière	> =75%	62%	55,0%	75,0%	62,0%					
	Part des patients de 16 à 64 ans en ALD ciblés par la campagne et vaccinés contre la grippe saisonnière	> =75%	62%	33,1%	75,0%	62,0%					
	Part des patientes âgées de 50 à 74 ans ayant bénéficié d'une mammographie au cours des 2 dernières années	> =80%	70%	69,5%	80,0%	70,0%	66,9%	62,9%	64,3%	↓	-13,1
	Part des patientes âgées de 25 à 65 ans ayant bénéficié d'un frottis au cours des 3 dernières années	> =80%	65%	57,1%	80,0%	65,0%	55,2%	56,6%	58,1%	↓↓	-24,8
	Part des patients âgés de plus de 65 ans traités par vasodilatateurs	< =5%	7%	10,3%	5,0%	7,0%	1,0%	1,1%	1,0%	↑↑	OBJECTIF CIBLE ATTEINT
	Part des patients âgés de plus de 65 ans traités par benzodiazépines à demi-vie longue*	< =5%	11%	14,3%	5,0%	11,0%	10,9%	10,4%	11,2%	↔	5,9
	Part des patients ayant débuté un traitement par BZD et dont la durée est supérieure à 12 semaines*	< =12%	13%	17,4%	12,0%	13,0%	15,4%	14,0%	14,8%	↓	3,4
	Nombre de prescriptions d'antibiotiques pour les patients de 16 à 65 ans sans ALD dans l'année (pour 100 patients)*	<37	40	50,8%	37	40	45,3	40,5	41,7	↓↓	8,3
Diabète	Part des patients diabétiques ayant eu 3 ou 4 dosages d'HbA1c dans l'année	> =65%	54%	43,5%	65,0%	54,0%	55,7%	53,8%	53,5%	↔	-9,3 mais OBJECTIF INTERMEDIAIRE ATTEINT
	Part des patients diabétiques ayant eu une consultation d'ophtalmologie ou un examen du fond d'œil au cours des 2 dernières années	> =80%	68%	60,7%	80,0%	68,0%	61,6%	62,1%	64,2%	↓↓	-18,4
	Part des patients diabétiques (hommes âgés de plus de 50 ans et femmes âgées de plus de 60 ans) traités par anti-hypertenseurs qui ont bénéficié d'un traitement par statine	> =75%	65%	52,8%	75,0%	65,0%	54,4%	60,2%	59,9%	↓↓	-20,6
	Part des patients diabétiques (hommes âgés de plus de 50 ans et femmes âgées de plus de 60 ans) traités par anti-hypertenseurs et statines qui ont bénéficié d'un traitement par aspirine faible dosage ou anticoagulant	> =65%	52%	50,1%	65,0%	52,0%	57,0%	58,2%	58,3%	↔	-8 mais OBJECTIF INTERMEDIAIRE ATTEINT
Efficience de la prescription médicamenteuse	Part des prescriptions d'antibiotiques dans le répertoire des génériques (en nb de boîtes)	> =90%	85%	79,3%	90,0%	85,0%	85,7%	83,8%	84,5%	↔	-4,3 mais OBJECTIF INTERMEDIAIRE ATTEINT
	Part des prescriptions d'IPP dans le répertoire des génériques (en nb de boîtes)	> =85%	68%	65,5%	85,0%	68,0%	99,9%	99,9%	99,9%	↑↑	OBJECTIF CIBLE ATTEINT
	Part des prescriptions de statines dans le répertoire des génériques (en nb de boîtes)	> =70%	46%	36,7%	70,0%	46,0%	65,4%	68,6%	65,0%	↔	-4,6 mais OBJECTIF INTERMEDIAIRE ATTEINT
	Part des prescriptions d'antihypertenseurs dans le répertoire des génériques (en nb de boîtes)	> =65%	64%	62,9%	65,0%	64,0%	79,7%	82,1%	81,6%	↑↑	OBJECTIF CIBLE ATTEINT
	Part des prescriptions d'antidépresseurs dans le répertoire des génériques (en nb de boîtes)	> =80%	75%	59,9%	80,0%	75,0%	83,1%	84,3%	84,8%	↑↑	OBJECTIF CIBLE ATTEINT
	Part des IEC sur l'ensemble des IEC/Sartans (en nb de boîtes)	> =65%	45%	41,2%	65,0%	45,0%	44,1%	42,0%	42,1%	↓	20,90
	Part des patients traités par aspirine faible dosage parmi les patients sous AAP	> =85%	84%	83,8%	85,0%	84,0%	88,2%	86,0%	87,0%	↑↑	OBJECTIF CIBLE ATTEINT

↓↓	Si très éloigné de l'objectif cible et de l'objectif intermédiaire
↓	Si proche de l'objectif intermédiaire mais n'atteignant aucun des 2 objectifs
↔	Si entre objectif intermédiaire et objectif cible
↑	Si dépasse légèrement l'objectif cible
↑↑	Si dépasse largement l'objectif cible