



INFECTIONS URINAIRES DE LA FEMME NON ENCEINTE

RECOMMANDATIONS ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ DE
PATHOLOGIE INFECTIEUSE DE LANGUE FRANÇAISE (SPILF)
ACTUALISATION 2021



Mise à jour : 13 mai 2022



FACTEURS DE RISQUES DE COMPLICATION

- Anomalie organique ou fonctionnelle connue de l'arbre urinaire
- Immunodépression grave
- Age > 75 ans ou âge > 65 ans et personne fragile
- Clairance créatininémie < 30 ml/min
- Grossesse évolutive -> cf. Mémo spécifique de la femme enceinte

CONDUITE À TENIR



Les fluoroquinolones n'ont plus de place, aujourd'hui, dans le traitement des cystites avec ou sans facteurs de risque de complications.



Pr Jean-Philippe JOSEPH

Professeur de Médecine générale,
Directeur du Département de Médecine générale, Université de Bordeaux



CYSTITE AIGÜE SIMPLE

DIAGNOSTIC

- Brûlures et douleurs à la miction et/ou pollakiurie et/ou impériosité mictionnelle, hématurie macroscopique (fréquente, environ 30 % des cas)
- **Absence de facteur de risques de complication**

EXAMEN

La bandelette urinaire (BU) est positive (leucocytes positifs et/ou nitrites positifs)

TRAITEMENT

1ÈRE INTENTION	2ÈME INTENTION
Fosfomycine-trométamol 3g dose unique	Pivmécillinam 400mg 2 fois par jour sur 3 jours

Les posologies journalières sont indiquées pour un adulte de poids normal à fonction rénale normale.



CYSTITE AIGUË À RISQUE DE COMPLICATION

DIAGNOSTIC

- Brûlures et douleurs à la miction et/ou pollakiurie et/ou impériosité mictionnelle, hématurie macroscopique (fréquente, environ 30 % des cas)
- **Présence d'au moins un des facteurs de risques de complication**

EXAMEN

BU + ECBU pour identifier le traitement adapté

TRAITEMENT

Si les symptômes le permettent, le traitement sera dans l'idéal différé, permettant d'emblée de choisir la molécule la plus appropriée.

1 Traitement probabiliste

(si les symptômes ne permettent pas d'attendre l'ECBU)

1ÈRE INTENTION	2ÈME INTENTION
<p>Nitrofurantoïne 100mg 3 fois par jour sur 7 jours</p>	<p>Fosfomycine-trométamol 3g dose unique</p>

2 Traitement adapté à l'antibiogramme

(si les symptômes permettent de surseoir au traitement probabiliste ou si ce dernier était inadapté)

1ÈRE INTENTION	2ÈME INTENTION
<p>Amoxicilline 1g 3 fois par jour sur 7 jours</p>	<p>Pivmécillinam 400 mg 2 fois par jour sur 7 jours</p>

La durée de traitement antibiotique mentionnée est la durée totale de traitement efficace (incluant la durée du traitement probabiliste le cas échéant). Les posologies journalières sont indiquées pour un adulte de poids normal à fonction rénale normale.

Pour les traitements de 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} intention, consultez le site antibiocliv.com



ANTIBIOCLIV.COM

OPTIMISEZ VOTRE STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

Outil **indépendant** d'aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie, pour un bon usage des antibiotiques

À **usage** unique des **professionnels de santé**

Son contenu suit les **dernières recommandations** françaises en vigueur.

Le contenu du site ne se substitue pas à la responsabilité de prescription du médecin.

Support réalisé avec la collaboration du Département de Médecine Générale de l'Université de Bordeaux